

■ 上手な使い方

● 「マツノマダラカミキリ」の防除

松枯れの犯人はマツノザイセンチュウです。その運び屋が「マツノマダラカミキリ」です。センチュウが侵入した松は手の施し様がありません。従って運び屋である「マツノマダラカミキリ」を早い時期に防除する事が絶対に必要です（5月上旬～下旬より1ヵ月ごとに3回）。

● 「ケムシ、アメリカシロヒトリ」、「アブラムシ」等の防除

ケムシ、アメリカシロヒトリ、アブラムシ等の庭木の害虫は、発生初期の防除が重要です。見つけたときにすぐ散布してください。

● 「カイガラムシ」の防除

5月下旬から幼虫が発生するので見つけたら15日間隔で「カイガラムシ」に対して十分量散布してください。

● 希釈表

薬剤の希釈（水1ℓに対して）			
60倍	100倍	250倍	500倍
16mℓ (キャップ約2杯)	10mℓ (キャップ約1.2杯)	4mℓ (キャップ約半分)	2mℓ (キャップ約1/4杯)

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む農薬の総使用回数	
まつ(生立木)	マツカレハ	100~250倍	3ℓ/本 (樹高10m)	幼虫発生前から幼虫発生期	5回以内	散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)	
	マツノマダラカミキリ成虫	60~100倍		成虫発生直前から発生初期				
さくら	クビアカツヤカミキリ	10倍	20~70ℓ/10a	成虫発生初期及び発生最盛期直前		散布		樹幹散布
		200倍		成虫発生初期				
	ケムシ類 カイガラムシ類 アブラムシ類	250倍 500倍		発生初期				
樹木類 (つつじ類、とちのき、プラタナス、さんごじゅ、ひいらぎもくせい、いぬまき、あじさい、さくらを除く)	ケムシ類 カイガラムシ類	250倍						
	つつじ類	ツツジゲンバイ チュウレンジハバチ アブラムシ類	500倍					
あじさい	コガネムシ類	250倍						
	とちのき		ケムシ類 カイガラムシ類 トチノキヒメヨコバイ アブラムシ類			500倍		
プラタナス	プラタナスゲンバイ	250倍						
	さんごじゅ		ケムシ類 カイガラムシ類 サンゴジュハムシ アブラムシ類		500倍			
ひいらぎもくせい	ヘリグロテントウノミハムシ アブラムシ類	250倍						
	いぬまき		カイガラムシ類 ケムシ類		100~250倍			
ばら		キオビエダシャク アブラムシ類	500倍					
	チュウレンジハバチ	100~300ℓ/10a		5回以内				

■ 上手な使い方

1. 本剤は無色透明のため、薬剤調製時には十分攪拌してご使用ください。
2. 蚕に対しては長期間毒性があるので、桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。
3. 降雨前後の薬液散布は効力が劣るので、使用をさけてください。

⚠ 安全使用上の注意

1. 誤飲のないように注意してください。誤って飲み込んだ場合はうがいをし、直ちに医師の担当を受けさせてください。
2. 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに流水で水洗いし、眼科医の担当を受けてください。
3. 使用の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをするとともに洗眼してください。
4. 街路、公園等で使用する場合には、使用中及び使用後（少なくとも散布当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう網囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
5. 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。保管：密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

100mℓ 入り



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

■ 販売元

株式会社ニッソーグリーン

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-1-2
 (秋葉原新高第一生命ビル5F)
 TEL：03-5816-4351
 URL：http://www.ns-green.com/