

# 清潔な育苗資材で 病害の侵入を防ごう!

農業用資材・農業用水浄化剤

有効成分:カルシウムハイポクロライト 70.0%(有効塩素)  
次亜塩素酸カルシウム

# ケミクロンG<sup>®</sup>



## 特長

- 1 本剤はあらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
- 2 使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。

適用場所	対象	水10ℓ当り使用量	希釈倍数(倍)	使用方法
農業資材	稲育苗箱、育苗トレイ・ポット、植木鉢、果実類貯蔵箱、温室用資材、農具、収穫用かご、催芽箱等消毒	10g	1,000	10分間浸漬
	プラスチック類の資材(稲育苗箱、育苗トレイ・ポット、果実類貯蔵箱、植木鉢)および育苗用敷紙(クラパビー等)の消毒	20g	500	瞬間浸漬またはジョウロ散布
	保温むしろの消毒(箱育苗用)	2g	5,000	ジョウロ散布
	種いも切断刀の消毒	1kg	10	5秒間浸漬
畝耕栽培	病原菌類に汚染した畝の消毒	10~5g	1,000~2,000	水深3cmとし所定薬量を表面に均一に散粒
灌漑用水・浸種用水	用水の消毒	0.2~0.1g	50,000~100,000	用水中に散粒溶解し灌水する

◎本剤は強力な酸化剤のため、金属類がさびやすく、また不用意に取り扱うと危険を伴うので、使用の際は製品ラベルの注意事項を必ず読んで、使用方法を守ってください。




日本曹達株式会社  
東京都千代田区大手町2丁目2番1号



# ケミクロンG

## ■ 農業資材の消毒方法

◎作業をする時は、必ずゴム手袋をしてください。もし直接皮ふに薬や濃厚液がついたときは、すぐ水でよく洗ってください。



## ■ 保管及び取扱上の注意事項 (必ずお読みください)

- ⚠ ●本剤は強力な酸化剤で、安易に取り扱うと発火その他の事故を生ずるおそれがありますので、下記の注意事項を必ず守ってください。
- (1) 直射日光が当たる所や小児の手の届く所には保管しないでください。
  - (2) 暖房装置、加温装置、モーター等の付近で温度が異常に高くなるおそれがある所には絶対保管しないでください。(長期間の保存には、30℃以下が望ましい。)
  - (3) 雨がかかる所や、水はけの悪い所に保管しないでください。
  - (4) 吸湿をさけるため、密閉して冷暗所に保管してください。
  - (5) 煙草の火など、火気は絶対に近づけないでください。
  - (6) 機械油、グリス、ペンキ、シンナー、食用油、グリセリン、揮発油などの物質、硫黄、木炭、ハイドロサルファイトなど還元性物質、硫酸、塩酸、有機酸などの酸、その他各種農薬、肥料などと直接触れさせないでください。
  - (7) 衣類に付着したら直ちに払い落とすか、水洗いをしてください。(漂白)
  - (8) ごみ収集車、ごみ箱・ごみ捨て場には絶対捨てないでください。
  - (9) 水産動植物に影響があるので、使用した残液を捨てる時には、必ず次のように処置してください。
    - 少量の液は、付近に影響を及ぼさない地面に穴を掘って捨ててください。
    - 大量の場合、ハイポまたは亜硫酸ソーダ(日曹ノンクローース)で、有効成分が残らないように中和してから徐々に排水してください。
    - 直射日光に1~2日さらし、有効成分の消失を確認してから徐々に排水してください。
    - いずれの場合でも、排水が養魚池等に入らないよう十分注意してください。
  - (10) 皮ふについた場合、長時間放置しないで水で洗い流してください。
  - (11) 眼に入った場合、直ちに流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当を受けてください。
  - (12) 誤って飲みこんだ時は、大量の水または牛乳を飲み、次にマグネシア乳剤または植物油、あるいは生卵を飲んで、直ちに医師の手当を受けてください。

## ■ 使用上の注意事項

- ⚠ 1 本剤を水に溶解した時若干残渣がみられる場合がありますが、有効成分は十分に溶け出しています。容器はプラスチックのものを使用してください。
- 2 金属類や木箱に使用した場合、必ずその後水洗してください。
  - 3 育苗トレイ・ポットを消毒する場合、葉害(生育障害)を生じるおそれがあるので、本剤処理後は必ず水洗してください。
  - 4 資材消毒に使用する本剤の希釈液は、使用時毎に調製して速やかに使用してください。
  - 5 浸漬の場合、薬液の汚れが甚だしくなったら新しく調製し直してください。
  - 6 礫耕栽培の場合、礫中の有機物を取り除き、表面を平らにし、水を礫面上3cmにし、全体の水量(全礫体積の30%を水量と計算)に対し、1,000~2,000倍になるよう薬量を均一に散粒、軽く表層を攪拌してください。処理は夕方行い、一夜放置後翌朝礫層をよく攪拌し排水し、十分水洗を行ってください。
  - 7 灌漑用水の消毒は規定濃度を厳守し、濃厚液が生育中の作物にかからないようにしてください。
  - 8 薬液を衣類につけると漂白されるのでご注意ください。
  - 9 本剤は強力酸化剤で、不用意に扱うと危険です。取扱い時の注意事項をよく守ってください。

## ■ 包装

500gポリ瓶×24本

### ● 本剤を使用するときは ●

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。



## 日本曹達株式会社

本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号  
 ☎(03)3245-6178 FAX(03)3245-6084  
 ホームページアドレス <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>

大阪支店 ☎(06)6229-7343 関東営業所 ☎(048)677-6010  
 札幌営業所 ☎(011)241-5581 名古屋営業所 ☎(052)238-0003  
 仙台営業所 ☎(022)227-1741 福岡営業所 ☎(092)771-1336  
 信越営業所 ☎(0255)81-2323 松山営業所 ☎(089)931-7315

本資料は2016年4月現在の内容に基づいています。