

液状カルシウム肥料 カルアミーゴ[®]

CALAMIGO



特長

- ① 本剤の補給により、細胞分裂時の細胞壁の形成が順調に行なわれ、新葉・新根・果実の生長が活発になります。また、細胞自体が強化されるので、品質・日持ちが向上します。
- ② 窒素成分を含まないので、生殖成長期にも安心して使用できます。
- ③ 多くの種類の農薬・肥料との希釈混用が可能です。*詳しくはお問い合わせください。
- ④ 希釈しやすい液状タイプです。



包装 2ℓ(2.45kg)×6本



株式会社 ニッソーグリーン

- 成分 カルシウム(CaOとして10%)、各種有機酸(6%)
- 性状 微黄色液体、PH:5.0(500倍希釈液)、比重:1.225
- 使用方法

*散布液量は一般農業と同一

対象作物	肥効	使用濃度	使用方法
野菜・果樹	カルシウム欠乏症の 予防・緩和	500~1,000倍	葉面散布



..... **上手な使い方**

カルシウム欠乏症により壊死した細胞は回復しませんので、早い時期から生長部位を中心に「カルアミーゴ」を定期的に葉面散布し、発生を予防してください。



代表的な作物	欠乏症状例
はくさい・キャベツ・レタス	芯腐症・縁腐症
トマト・ピーマン	尻腐果・新葉黄化
いちご	チップバーン
りんご	ビターピット・コルクスポット・油上がり
なし	みつ症・コルクスポット・ユズ肌症
かんきつ類	浮皮・水腐れ・裂果

■その他のカルシウム欠乏症

- ぶどう(新葉葉縁の葉焼症) ●おうとう(うるみ果) ●しゅんぎく(芯枯症) ●かき(うるみ果)
- たまねぎ・セルリー(芯腐症) ●メロン(発酵果・変形果) ●ききょう・トルコギキョウ(葉先枯症)
- びわ(裂果症・そばかす症) ●なす(葉縁の黄化、がく割れ果) ●そらまめ(種子腐敗)
- すいか(変形果) ●てんさい(芯焼け症) ●きゅうり(落下傘葉、クビレ果、葉縁の黄化)
- はなやさい(新葉の先枯れ症) ●もも(みつ症) ●チューリップ(首折れ曲り)
- だいこん・かぶ(芯腐症、葉縁の黄化) ●さといも(芽つぶれ症) ●さつまいも(つるぼけ)

⚠ **使用上の注意**

- 使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用前にラベルの表示事項をよく読んでください。
- カルシウム欠乏症が発現した細胞は回復しませんので、手遅れにならないように早めに散布してください。
- カルシウム欠乏症が出やすい部位(花房、果実、新葉、生長点、結球部など)によくかかるように十分量散布してください。
- 皮ふに付着しないように注意し、付着した時は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 本剤が眼に入らないように注意し、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の診断を受けてください。
- 誤飲・誤食などのないように注意し、誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
- 農業を混用する場合は本剤を希釈してから農業を添加してください。
- 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する危険性があるので混用はしないでください。
- 保管は密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別し小児の手の届かない冷涼な場所に保管してください。
- 破損しないように注意して取り扱って下さい。荷崩れ防止を確実に行って下さい。

空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

販売元  **株式会社 ニッソーグリーン**
 東京都台東区上野3-1-2(秋葉原新高第一生命ビル5F)
 〒110-0005 Tel.03-5816-4351
<http://www.ns-green.com/>

取扱店