

適用病害と使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	プロパモカルブ塩酸塩を含む農薬の総使用回数	使用方法
西洋芝 (ペントグラス)	赤焼病	400~600	1ℓ/m ²	発病初期	8回以内	8回以内	散布
	ピシウム病	500	0.5ℓ/m ²				

農薬使用者への被害防止方法

使用者(調製時): 不浸透性手袋

使用者(散布時): 農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣

上手な使い方



△ 効果・薬害等の注意

- 本剤は酸性溶液なので、金属の器具、容器を使用した場合は、使用後よく水洗してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

■ 包装: 1ℓ×10本

△ 農薬使用者に係る注意事項

- ① 毒性情報
アレルギー性反応をおこすおそれがあります。
- ② 安全使用上の注意
1) ミストを吸入しないでください。
2) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
3) 汚染された衣服は脱いでください。
4) 作業後は、身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

- 6) 公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ③ 応急処置
皮ふに付着した場合、よく洗い落として下さい。皮ふ刺激または発疹が生じた場合、医師の手当を受けてください。
- 保管: 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。

この資料は2026年10月現在の登録に基づいて作成しています。

販売 株式会社 理研グリーン
〒110-8520 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 8F
TEL.03(6802)8571 FAX.03(6802)8577 <http://www.rikengreen.co.jp>

製造元 日本曹達株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

No.12376-2610CC

(株)理研グリーン・パートナーショップ

芝用殺菌剤

日曹 プレビクール®N 液剤

プロパモカルブ塩酸塩液剤

Previcur® N

®はバイエルグループの登録商標

包装規格: 1ℓ×10

株式会社 理研グリーン

特長

1. ピシウム性病害に卓効

卵菌類・藻菌類による病害に特異的に効果を示し、ベントグラスの赤焼病及びピシウム病に高い防除効果を発揮します。

2. 予防効果と進展阻止効果が高い

病原菌の感染・侵入阻止（予防効果）が特に優れており、また病原菌の進展阻止、胞子形成阻害などの効果も併せ持っています。

3. 浸透性が強い

浸透性が強く、茎葉部へ移行して効果を発揮します。

4. 耐性菌の心配が少ない

これまで耐性菌の出現は認められておらず、薬剤耐性の心配はほとんどありません。
FRACコード: 28

5. 薬害が少ない

作物に対する薬害の心配が少ない薬剤です。

成分・性状

商品名：プレビクール®N液剤

一般名：プロパモカルブ塩酸塩

化学式：プロピル＝3-(ジメチルアミノ)
プロピルカルバマート塩酸塩

構造式：
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \end{array} \text{N}-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}-\text{COOC}_3\text{H}_7 \cdot \text{HCl}$$

含有量：プロパモカルブ塩酸塩……64.0%

殺菌剤分類 28

性状：淡黄色澄明水溶性液体

安全性

■人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

急性毒性

経口 ラット(LD₅₀)：2,000～5,000mg/kg

経皮 ラット(LD₅₀)：>2,000mg/kg

■水産動物植物に対する影響


コイ (LC₅₀)：235mg/ℓ (96hr)

ミジンコ (LC₅₀)：295mg/ℓ (48hr)

藻類 (ErC₅₀)：350mg/ℓ (96hr)

試験成績

【赤焼病に対する効果】



1988年 千葉大学園芸学部


発生状況：多発生(接種)

品 種：ハイランドベントグラス


散 布：7/6、13、20、27、8/3、10 合計6回

処 理 量：1ℓ/m²

調 査：8/24



【ピシウム病に対する効果】




2000年 近畿大学農学部

発生状況：甚発生(接種)

品 種：ペンクロス

散 布：6/11(接種1日前)、6/14(接種2日後)

調 査：6/22



2000年 関西グリーン研究所

発生状況：少～中発生(接種)

品 種：ペンクロス

散 布：9/11(散布5日後に接種)

調 査：9/19

