

凍・霜害から果樹、野菜をしっかりと守る!

特殊海藻クリーム入り葉面散布用肥料

ラメオ[®] 1号

総合微量要素配合

被害の出る前と 霜が降りてから散布

特殊海藻クリームには干ばつや塩害、霜害に耐える上で重要な役割をもつベタインが高濃度含まれています。
(他の海藻エキスの5～13倍)

- 本剤は海藻『アスコフィラム・ノドサム』をクリーム状にし、20%配合した海藻液肥です。
肥料成分のほかに植物の生長に不可欠な天然の各種アミノ酸、アルギン酸、多糖類、ビタミン類、核酸、酵素、色素、植物ホルモン様物質（サイトカイニン）およびベタインを豊富に含んでいます。
- 肥料成分とバランスの良い天然成分との相乗効果により、すばらしい生育増進・増収および品質向上効果を発揮します。また、各種微量要素欠乏にも有効です。

新葉充実
凍・霜害から回復!!



成分	保証成分(%)						配合成分(%)				特殊海藻 クリーム(%)
	窒素	りん酸	加里	苦土	マンガン	ほう素	鉄	銅	亜鉛	モリブデン	
	7.0	4.0	3.0	2.0	0.20	1.00	0.10	0.05	0.05	0.100	20.0

りんごの使用時期と使用方法(例)	使用目的	使用時期	使用回数	使用量	使用方法
	凍害軽減、霜害軽減	発芽直前～展葉期	1～2回	500～1,000倍	茎葉散布
	新葉充実、結実向上、生育増進	開花始～落花期	2～3回	1,000～2,000倍	



株式会社ニッソーグリーン

■ 使用時期 及び 使用方法 (果樹)

冷・霜害の軽減に
500～1,000倍

新葉充実・結実向上に
1,000～2,000倍

4月上旬～中旬

4月下旬

5月上旬

5月中旬

5月下旬

発芽直前

発芽期

展葉期

花蕾
露出期

花蕾
着色期

開花始

満開期

落花期

■ ラメオ1号のりんごの凍霜害からの回復効果試験

ラメオ1号
500倍



【試験方法】

実施場所：静岡県牧之原市坂部62-1 榛原フィールドリサーチセンター

供試植物：りんご ハウス内で新葉展開させた1年生苗木

品 種：らくらくふじ (M26台)

散布月日：平成24年3月13日

調査月日：平成24年3月15日 (散布2日後)、21日 (8日後)、3月28日 (15日後)

【摘 要】

散布前日からハウス外に供試樹を置き、3月13日の朝に水道水を散布して凍霜害の発生を促した。約4時間後に供試樹をハウス内に取り込み、ラメオ1号の散布を行った。

無処理区では比較的重い被害 (葉縁壊死) が認められたが、ラメオ1号散布区ではその程度が軽かった。ラメオ1号の500倍散布地区と1000倍区を比較すると、500倍区の方が軽く、散布8日後の観察ではラメオ1号散布区では被害は認められなかった。

無処理



3月21日

■ ラメオ1号耐寒性試験

植物が寒さにあった後にラメオ1号を散布し回復の度合いをみた。

ラメオ1号
500倍



供試植物：コリウス

処理時期：1月14日に、温室で育てたコリウスを1晩温室外 (最低気温2度) の低温にさらし、温室内に入れ「ラメオ1号」を散布した。

散布肥料：ラメオ1号500倍
1月15日に1回散布

調査方法：達観調査とした。

明らかにラメオ1号
500倍 散布区の
生育回復が早かった。

無処理



1月15日

1月19日

包装：1kg×12本、10kg×2本

▲ 注意事項

- 石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスが発生する恐れがあるので混用しないでください。
- マシン油とは混用事例がないので混用しないでください。
- 農薬と混用する場合は水に ①展着剤 → ②ラメオ → ③農薬 の順に混用してください。
- 極端な低温時には効果が劣る事があります。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●使用量に合わせた薬液を調製し、使い切ってください。 ●空ピンは圃場などに放置せず、適切に処理してください。

販売元

 株式会社ニッソーグリーン

〒110-0005 東京都台東区上野3-1-2 (秋葉原新高第一生命ビル5F)

TEL.03-5816-4351 <http://www.ns-green.com/>