

さくらを守ろう!

散布に適用拡大

マツググリーン[®]液剤2

種 類 名：アセタミプリド液剤
 有効成分：アセタミプリド 2.0%
 化 学 名：(E)-N' [(6-クロロ-3-
 ピリジル)メチル] -N²-
 シアノ-N'-メチルアセト
 アミジン
 性 状：無色澄明水溶性液体

普通物 (※毒劇物に該当しないものを指している選称)

散布と注入でクビアカツヤカミキリを駆除



フラスを見つけたら即防除!



写真提供：徳島県



【内容量】
 1L×12本、10L×1缶



■ 適用害虫と使用方法 (抜粋)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む 農薬の総使用回数
さくら	クビアカツヤカミキリ	20倍	20~70	成虫発生 初期	5回以内	樹幹散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)
		200倍	200~700	発生初期		散布	
		50倍	—			食入孔に注入	

■ 散布適期 6月上旬~7月下旬

クビアカツヤカミキリは6月上旬より成虫となり、樹木から脱出します。
 十分な薬液を樹幹全体に一気に散布することが防除のポイントとなります。




株式会社ニッソーグリーン

■ 食入孔に注入する場合は以下の点に注意してください。

1. 注入する前に食入孔の木屑を除去してください。
2. 薬剤が食入孔から逆流するまで注入してください。


■ 注入機材例

加圧式噴霧器




注入先端部例


100μLのピペットチップを
ノズルの先端に熱圧縮チューブで取り付ける



■ 食入孔注入施工実施例



注入する前に食入孔周辺の木屑を除去



薬剤が食入孔から逆流するまで注入

■ 上手な使い方

1. 本剤は無色透明のため、薬剤調製時には十分攪拌してご使用ください。
2. 蚕に対しては長期間毒性があるので、桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。
3. 本剤の10ℓ容器は金属缶のため、外から薬液が見えませんが、薬剤投入時は容器に薬剤が残らないよう注意してください。
4. 降雨前後の薬液散布は効力が劣るので、使用をさけてください。

⚠ 安全使用上の注意

1. 誤飲のないように注意してください。誤って飲み込んだ場合はうがいをし、直ちに医師の手当を受けさせてください。
2. 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに流水で水洗いし、眼科医の手当を受けてください。
3. 使用の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをするとともに洗眼してください。
4. 街路、公園等で使用する場合には、使用中及び使用後（少なくとも散布当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう網囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

5. 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、涼涼な所に保管してください。

⚠ 本剤を使用するときは

1. ラベルをよく読んでください。
2. ラベルの記載以外には使用しないでください。
3. 本剤を小児の手の届く所に置かないでください。

■ 販売元



株式会社ニッソーグリーン

東京都台東区上野3丁目1番2号
☎03-5816-4351 <http://www.ns-green.com/>

■ 製造元



日本曹達株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号