



株式会社ニッソーグリーン

Concrete



コンクレードフロアブルは
一年生雑草への安定した効果と
日本芝・バーミューダグラスへの
高い安全性が特長。
新規の作用機作を持つ
トリアゾールカルボキシアミド系の
芝用土壌処理型除草剤です。

コンクレード® フロアブル



®は日本曹達株式会社の登録商標です。

特 長

1 幅広い殺草スペクトラム

スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。

2 長い残効性

標準薬量(0.2mℓ/m²)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。

3 安定した除草効果

土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。

4 従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作

既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。

5 芝生への高い安全性

ターフを形成した日本芝(コウライシバ、ノシバ)・パーミューダグラスに対して、高い安全性を有しています。

安全性(製剤)

●人畜に対する安全性

急性経口毒性(LD50)	ラット
急性経皮毒性(LD50)	ラット
皮膚刺激性	ウサギ
眼刺激性	ウサギ
皮膚感作性	

♀: >2000mg/kg
♂♀: >2000mg/kg
刺激性なし
弱い刺激性
陰性

●環境に対する安全性

コイ	LC50 (96hr): 2.3mg/L ※
ミジンコ	EC50 (48hr): 3.9mg/L ※
藻類	ErC50 (72hr): >54.2mg/L ※

※: 原体での試験データ

作用機作

コンクルードフロアブルの有効成分であるフルボキサムは、雑草の根端・幼芽部分裂組織に接触する事で作用します。また、細胞分裂時の細胞壁の合成を阻害(セルロース合成阻害)する事により、枯死にいたらしめます。植物体内での移行性はほとんどありません。



殺草スペクトラム(土壌処理効果)

コンクルードフロアブル 0.2mℓ/m²

雑 草	効果
イネ科	メヒシバ ●
	アキメヒシバ ●
	スズメノカタビラ ●
	オヒシバ ●
	エノコログサ ◎
	スズメノテッポウ ●
	スズメノヒエ ※ □
アブラナ科	タネツケバナ ●
シソ科	ヒメオドリコソウ ●
キク科	オオアレチノギク ●
	ハルジオン ●
	ヒメジオン ●
	ノボロギク ●
	セイヨウタンポポ ※ ●
	ノゲシ ●
	ウラボリチチコグサ ※ ●
	ヒメムカシヨモギ ●


雑 草	効果
マメ科	シロツメクサ ●
	コメツブツメクサ ●
	ヤハズソウ ◎
	カラスノエンドウ ●
ナデシコ科	ツメクサ ●
	ハコベ ●
	オランダミナグサ ●
ゴマノハグサ科	オオイヌノフグリ ●
	タチヌノフグリ ●
スベリヒユ科	スベリヒユ ●
オオバコ科	オオバコ ●
タデ科	オオイヌタデ ●
トウダイグサ科	コニシキソウ ●
カヤツリグサ科	一年生カヤツリグサ ●

効果: ●極大(100%)、◎極大(99~95%)、○大(94~90%)、□中(89~80%)、△小(79~60%)、×無(59%~)

2022~2023年 日本曹達(株) 小田原研究所


※: 多年生雑草(は種出芽前処理での効果)

コンクルードフロアブルの土壌移行性



■ 散布時期と効果持続期間

コンクールドフロアブルは、標準薬量(0.2ml/m²)で一年生雑草を春処理では120日以上、秋処理では180日以上長い期間にわたって抑えます。ただし、既に発生した雑草が認められる場合には、コンクールドフロアブルは効果がありませんので、茎葉処理剤との組合せをおすすめします。



公式委託試験成績(抜粋)

■ 春処理

試験機関：泉パークタウンGC(2021年)
芝品種名：コウライシバ
処 理 日：2021/4/2
調 査 日：2021/7/1

使用量(ml/m ²)	0.15	0.2	0.3	対照剤
スズメノカタビラ	○	●	●	○
オランダミミナグサ	●	●	●	●
コニシキソウ	●	●	●	●

■ 秋処理

試験機関：新中国グリーン研究所(2021年)
芝品種名：ノシバ
処 理 日：2021/9/17
調 査 日：2022/1/11

使用量(ml/m ²)	0.15	0.2	0.3	対照剤
スズメノカタビラ	◎	◎	◎	◎
オランダミミナグサ	●	●	●	◎
ヒメジオン	●	●	●	◎

試験機関：植調茨城結城試験地(2021年)
芝品種名：パーミューダグラス(ティフトン419)
処 理 日：2021/9/24
調 査 日：2022/3/1

使用量(ml/m ²)	0.15	0.2	0.3	対照剤
スズメノカタビラ	●	●	●	◎
オランダミミナグサ	●	●	●	●
オオイヌノフグリ	●	●	●	◎

効果：●極大(100%)、◎極大(99～95%)、○大(94～90%)、□中(89～80%)、△小(79～60%)、×無(59%～)

■ 芝生に対する安全性試験

コウライシバ・ノシバ

(春処理)

薬 量 (ml/m ²)	コウライシバ		ノ シ バ	
	生育抑制	クロロシス	生育抑制	クロロシス
0.2	—	—	—	—
0.4	—	—	—	—
0.6	—	—	—	—

生育抑制：—(無)～++++ (完全枯死) クロロシス：—(無)、±(軽い黄化)、+(黄化)、++(黄化～壊死)、+++ (ネクロシス)

(秋処理)

薬 量 (ml/m ²)	コウライシバ			ノ シ バ		
	生育抑制	クロロシス	翌春の緑化	生育抑制	クロロシス	翌春の緑化
0.2	—	—	問題なし	—	—	問題なし
0.4	—	—	問題なし	—	—	問題なし
0.6	—	—	問題なし	—	—	問題なし

2022～2023年 日本曹達（株）小田原研究所

パーミューダグラス

(春処理)

薬 量 (ml/m ²)	ティフトン419
0.3	—
0.6	—

生育抑制：—(無)～++++ (完全枯死)

2021年 日本曹達（株）小田原研究所

(秋処理)

薬 量 (ml/m ²)	ティフトン419	
	生育抑制	翌春の緑化
0.3	—	問題なし
0.6	—	問題なし

生育抑制：—(無)～++++ (完全枯死)

2022年 日本曹達（株）小田原研究所

■ 周辺樹木への影響

周辺樹木へのドリフトは春先の新梢展開期には影響がみられますので注意してください。

春処理 (薬量0.3ml/m² 水量200ml/m²)

薬害なし：サツキ、ツツジ、コノデガシワ、ドウダンツツジ、ヤナギ、マツ、
ゴールドクレスト、ヒイラギ、カエデ、ツゲ、マキ、マサキ

薬害あり：(新葉のアントシアン症状) カナメモチ、サンゴジュ、モッコク
(新葉の褐変壊死) ヤマモモ、サルスベリ、サザンカ、サクラ

秋処理 (薬量0.6ml/m² 水量200ml/m²)

薬害なし：サツキ、ツツジ、カナメモチ、サンゴジュ、コノデガシワ

2005～2006年 日本曹達（株）小田原研究所


(参考) コンクールド顆粒水和剤より

農林水産省登録：第24885号

人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)

商品名：コンクルードフロアブル
種類別：フルポキサム水和剤
有効成分：フルポキサム・・・42.0%

構造式：



包装：500ml × 8本

性状：淡青緑色水和性粘稠懸濁液体
比重：1.2

■ 適用作物・雑草と使用方法 ■

*印は本剤およびフルポキサムを含む農薬の総使用回数

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量 (/10a)		総使用回数 *		使用方法
			薬量 (ml)	散布水量 (ℓ)	本剤	フルポキサム	
日本芝 西洋芝 (パーミューダグラス)	一年生雑草	芝生育期 (雑草発生前)	150～300	200～300	2回以内	2回以内	全面 土壌 散布

(2025年7月現在の登録内容)

⚠ 効果・薬害などの注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 張り芝や撒き芝等の活着前の芝生への使用は薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 春先の新梢展開期に影響を及ぼすおそれがあるので、周辺樹木へ飛散しないように注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない、なるべく低温な所に保管してください。

使用量に合わせ薬液を秤量し、使い切ってください。空ボトルは圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売元



株式会社ニッソーグリーン

東京都台東区上野3-1-2 (秋葉原新高第一生命ビル5F)
〒110-0005 Tel.03-5816-4351

製造元



日本曹達株式会社

本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-2

